

Haute-Loire
Bulletin N° 21
5 Mai 2009


LE STADE DES CEREALES SELON L'ALTITUDE AU 5/05/09

ORGE D'HIVER :

Inférieur à 800 m : fin de montaison à épisaison
De 800 à 900 m : 2 nœuds à sortie des barbes
Au-dessus de 1000 m : 2 nœuds


BLE :

Inférieur à 800 m : 2 nœuds à dernière feuille étalée
De 800 à 900 m : 1 - 2 nœuds à fin montaison
Au-dessus de 1000 m : 1 - 2 nœuds




Gonflement

Il ne reste plus de feuille engainant l'épi
L'épi gonfle la gaine
mais n'est pas encore visible



Epiaison



Fin épisaison :
50 % des épis
totalément sortis hors de la gaine
le champ a un aspect de « table »

LES MALADIES DES CEREALES SUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT

Les conditions climatiques du printemps 2009 ne sont pas propices au développement des maladies du feuillage. Les contaminations et la pression parasitaire sont de faible niveau et bien inférieures à 2007 ou 2008.

I. ORGE D'HIVER : NE PAS NEGLIGER UN TRAITEMENT FONGICIDE PREVENTIF

Pour l'instant les attaques sont très discrètes sur les zones en dessous de 900 mètres et légèrement plus présentes au-dessus.

Un traitement préventif est à prévoir compte tenu de la sensibilité de cette espèce aux maladies (rhynchosporiose, helminthosporiose, grillures) :

1. En début d'épiaison sur les zones inférieures à 900 mètres.
2. Au stade fin montaison à barbe pointante au-dessus de 900 mètres.

Une période pluvio-orageuse annoncée cette fin de semaine sera propice au développement des maladies. En cas d'attaque généralisée de la troisième feuille sur l'ensemble de la parcelle, traiter en priorité les parcelles qui présentent un potentiel supérieur à 40 Qx/Ha (plus de rentabilité du traitement).

PRECONISATION : QUEL PRODUIT ET QUELLE DOSE UTILISER ?:

- une application à ½ dose assure cette couverture préventive recherchée pour un coût d'environ 30 €/Ha

FANDANGO. S (*prothioconazole + fluxastrobine* à 1 Litre / Ha.
JOAO (*prothioconazole*) à 0,4 Litre / Ha.

II.-BLE - TRITICALE - SEIGLE : PAS DE TRAITEMENT SYSTEMATIQUE

Tous secteurs ⇒ peu d'évolution des maladies

La septoriose est peu présente sur les feuilles.

Aucun traitement n'est justifié actuellement.

Surveillez vos parcelles une fois par semaine entre mi-mai et fin juin

La rentabilité économique des traitements fongicides est moins probante sur ces trois espèces.