

# INFO-prairies Cantal

Bulletin n°9  
Le 02 mai 2011

Cumul des températures en degrés au **1 mai 2011**

(cumul calculé à partir du 1er FEVRIER, 0 – 18 °C , sur la base des températures moyennes journalières - Source : Météo-France - Traitement CA15)

Plaine (300 à 500 m)	°C	Moyenne montagne (500 à 850 m)	°C	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	°C	Montagne (> 1100 m)	°C
MAURS (480 m)	<b>902</b>	AURILLAC (639 m)	<b>747</b>	COLTINES (979 m)	<b>490</b>	LAVEISSIERE (1238 m)	<b>474</b>
		MAURIAC (674 m)	<b>755</b>	MARCENAT (1075 m)	<b>522</b>	ANZAT LE LUGUET (1270 m) ( PUY DE DOME )	<b>506</b>
		ST-PONCY (805 m)	<b>611</b>	DEUX VERGES (1080 m)	<b>544</b>		
Gain moyen depuis le 24 avril 2011	<b>101</b>	Gain moyen depuis le 24 avril 2011	<b>81</b>	Gain moyen depuis le 24 avril 2011	<b>67</b>	Gain moyen depuis le 24 avril 2011	<b>64</b>

## Conseils de la semaine

**Cette année 2011 est vraiment atypique. Après un démarrage précoce, la végétation est quasiment à l'arrêt sur une bonne partie du département. Il faut éviter le surpâturage qui retarderait encore davantage le redémarrage des prairies.**

**En plaine**, les premières coupes sont réalisées, les repousses seront affectées en priorité à la pâture (apporter 30 UN pour relancer la pousse dès le retour de la pluie). En attendant, il faut tourner sur les pâtures avec du stock en complément quand c'est possible. Certains agriculteurs envisagent la possibilité de récolter les céréales en immature si le temps sec persiste.

**En moyenne montagne**, Les 750°C, stade repère des ensilages et enrubannage précoce ont été atteints. Il faut récolter dès que possible, même si les rendements sont faibles, sinon l'agrandissement de la pâture avec les repousses sera d'autant plus retardé. **Ne fauchez pas trop bas pour permettre un redémarrage plus rapide (6 à 7 cm)**. Sur certaines structures, la rupture du pâturage est proche, il faut compléter en stock et quand ce n'est pas possible consommer des parcelles de fauche (reprise de prés déprimés précocement ou consommation de parcelles prévues en foin = stock d'herbe sur pieds).

**Pour les plateaux d'altitude et en montagne**, la pousse est également très lente. Le repère de fin de déprimage (500°C) est atteint avec plus de 10 j d'avance sur 2010. Les animaux sont dans le premier tour de pâture. Là aussi le déprimage peut être prolongé, mais avec un risque de perte de rendement sur les premières coupes. Il conviendra également de relancer la pousse avec 30 UN à la sortie du déprimage.

Bulletin réalisé par les  
conseillers de la Chambre  
d'Agriculture du CANTAL dans  
le cadre du programme régional  
-PRDA « Autonomie  
Fourragère » - et le soutien  
financier du Ministère de  
l'Agriculture et de la Pêche -  
CasDAR

Bulletin consultable sur le site  
[www.cantal.chambagri.fr](http://www.cantal.chambagri.fr) depuis  
le 04 mai 2011